



## KLINIČNA POT - OBRAVNAVA VROČINSKEGA KRČA PRI OTROKU

- 1) Ime in priimek otroka: \_\_\_\_\_ Datum obravnave: \_\_\_\_\_  
Datum rojstva: \_\_\_\_\_
- 2) Zdravnik: \_\_\_\_\_

### OBRAVNAVA OTROKA S SUMOM NA VROČINSKI KRČ

**Vitalni znaki ob prihodu** \_\_\_\_\_ h

Spo2: \_\_\_\_\_ %      PULZ: \_\_\_\_\_ /min      RR \_\_\_\_\_ mmHg

TT \_\_\_\_\_ °C      Telesna teža: \_\_\_\_\_ kg      Zavest: A V P U

Če telesna teža ni znana/si v dvomih – uporabi barvni trak za otroke.

**Začetek obravnave:** ob \_\_\_\_\_ h

**Kratka anamneza težav:** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

#### **A: OSKRBA DIHALNE POTI (poglej, poslušaj, čuti):**

- aspiracija dihalne poti    DA    NE
- NG sonda                      DA    NE

#### **B: DIHANJE**

- diha spontano; fr. dihanja \_\_\_\_\_ /min; pomožna dihalna muskulatura
- dodatek kisika: \_\_\_\_\_ L/min preko NK / OBRAZNA MASKA

#### **C: CIRKULACIJA**

- pulz, KP, koža (hladna/topla/potna)
- IV. KANAL, IO. KANAL \_\_\_\_\_



**TERAPIJA:**

Antipiretik (obkroži):                voltaren 12,5 mg                    voltaren 25 mg  
    paracetamol 60 mg                paracetamol 120 mg rektalno

**Prekinjanje krčev (obkroži):**

diazepam - Stesolid 5 mg (< 13 kg TT) rektalno

diazepam – Stesolid 10 mg (>13 kg TT) rektalno

**ALI**

midazolam bukalno Epistatus 0,3 mg /kg TT (< 20 kg TT) \_\_\_\_\_ mg bukalno

midazolam bukalno Epistatus 0,2 mg/ kg TT (> 20 kg TT) \_\_\_\_\_ mg bukalno

Maksimalni enkratni odmerek midazolama je 10 mg; maksimalni dnevni odmerek midazolama je 20 mg.

**Vročinski krč se prekine (obkroži):**

- spontano po \_\_\_\_\_ min
- po antikonvulzivni terapiji po \_\_\_\_\_ min
- se ne prekine in traja dlje kot 15 min

**Potreben je transport v bolnišnico:**            DA  
    NE

**Klinični pregled in iskanje izvora vročine**

---

---

---

**Zaključek obravnave in navodila staršem:**

---

---

---



## **AKUTNA OBRAVNAVA VROČINSKEGA KRČA PRI OTROKU**

Po prvi epizodi vročinskega krča je priporočljiv sprejem v bolnišnico na opazovanje (izključitev okužbe osrednjega živčevja, drugi možni vzroki konvulzij), ob morebitnih naslednjih epizodah pa sprejem ob jasnem mestu okužbe ni nujen.

### **NASVET STARŠEM**

Vročinski krči se lahko ponavljajo do 5. leta starosti. Povišano telesno temperaturo pri otrocih, ki so že imeli vročinski krč znižujemo pri 37,5°C (merjeno pod pazduho) oz. 38°C (merjeno v ušesu). Ob ponovitvi konvulzij, ki trajajo več kot 2 min, staršem svetujemo dajanje zdravil (Stesolid, Epistatus) v ustreznem odmerku.

### **VIR:**

1. Bolj ali manj nujna stanja v pediatriji, K. Vincek, M. Mramor, Ljubljana, 2017.
2. Zbornik slovenske pediatrije Rogač, Kopač. Vročinski krči in epilepsija, 2013.